


# ¡Manténgase al día con las **vacunas** de su hijo(a)!

**Las vacunas mantienen a su hijo(a) sano(a) protegiéndolo(a) de enfermedades infecciosas.**

Su hijo(a) necesita muchas vacunas a medida que crece, la mayoría de ellas durante el primer año. Esta guía indica las edades en que su hijo(a) debe comenzar a recibir cada vacuna desde 0 a 6 años de edad.



Para obtener más información sobre las vacunas y las enfermedades contra las que brindan protección, visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades en <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html>.

# Los primeros años: ¡obtenga las vacunas adecuadas para la edad adecuada de su hijo(a)!

**INICIO**

Nacimiento  
Hep B



2 meses  
DTaP, HepB,  
Hib, IPV,  
PCV, RV

4 meses  
DTaP, Hib,IPV,  
PCV, RV

6 meses  
COVID-19, gripe,  
HepB, Hib,  
PCV, RV



12 meses  
HepA, Hib,  
MMR, PCV,  
Varicela

15 meses  
DTaP



18 meses  
Hep A

4 años  
DTaP, IPV, MMR,  
Varicela

Muy bien,  
felicita-  
ciones



Continúe con  
las vacunas  
anuales contra  
la gripe y el  
COVID-19



## LAS VACUNAS SON IMPORTANTES

Para ayudar a mantener a su hijo(a) lo más saludable posible:

- ☉ Cumpla con el programa de vacunación.
- ☉ Si su hijo(a) ha omitido alguna vacuna, pregúntele a su proveedor cómo ponerse al día. Es posible que todavía pueda recibir las vacunas que le faltan.
- ☉ Hable con el proveedor de su hijo(a) si tiene alguna pregunta sobre las vacunas.



Clave de la vacuna		Total de vacunas	A partir de las edades de
<b>COVID-19</b>	Coronavirus 2019	En curso**	6 meses
<b>DTaP</b>	Difteria, tétanos y tos ferina	5	2 meses
<b>Gripe</b>	Influenza	Anual*	6 meses
<b>HepA</b>	Hepatitis A	2	12 meses
<b>HepB</b>	Hepatitis B	3	Nacimiento
<b>Hib</b>	Meningitis	3-4**	2 meses
<b>IPV</b>	Polio	4	2 meses
<b>MMR</b>	Sarampión, paperas y rubeola	2	12 meses
<b>PCV</b>	Neumonía	4	2 meses
<b>RV</b>	Rotavirus	2-3 **	2 meses
<b>Varicela</b>	Varicela	2	12 meses

\* Para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban la vacuna contra la gripe por primera vez. La recomendación es recibir dos dosis con un intervalo de al menos cuatro semanas.

\*\* El número total de vacunas depende de la edad del niño y el tipo de vacuna.