


Tutukan ang mga bakuna ng **inyong anak!**

Sa pamamagitan ng mga bakuna, nananatiling malusog ang inyong anak sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa mga nakakahawang sakit.

Nangangailangan ng maraming bakuna ang inyong anak habang lumalaki siya — ang karamihan sa mga ito ay sa unang taon. Inilista ng gabay na ito ang mga edad ng inyong anak kung kailan niya dapat makuha ang bawat bakuna mula 0-6 na taong gulang.



Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga bakuna at mga sakit na kaya nitong iwasan, bisitahin ang website ng Centers for Disease Control sa <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html>

Maliliit na Hakbang — bigyan ng tamang bakuna ang inyong anak sa tamang edad!

Simula


Pagkasilang
Hep B



2 Buwan
DTaP, HepB,
Hib, IPV,
PCV, RV

4 buwan
DTaP, Hib, IPV,
PCV, RV

6 buwan
COVID-19, Flu,
HepB, Hib,
PCV, RV



12 buwan
HepA, Hib,
MMR, PCV,
Varicella

15 buwan
DTaP



18 buwan
Hep A

4 taon
DTaP, IPV, MMR,
Varicella

Ipagpatuloy
ang taunang
bakuna laban
sa trangkaso at
COVID-19

Nagawa
mo



MAHALAGA ANG MGA BAKUNA

Para makatulong na panatilihin malusog ang inyong anak hangga't maari:

- Manatili sa iskedyul.
- Kung nakalaktaw ng bakuna ang anak ninyo, kausapin ang kanyang tagabigay ng serbisyo kung paano makakahabol. Baka puwede pang maihabol ang inyong anak sa mga nalaktawan niyang bakuna.
- Makipag-usap sa tagabigay ng serbisyo ng inyong anak kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa mga bakuna.



Vaccine Key		Kabuuang mga bakuna	Simula sa mga edad na
COVID-19	Coronavirus 2019	Tuloy-tuloy**	6 buwan
DTaP	Diphtheria, Tetanus, at Pertussis	5	2 buwan
Flu	Trangkaso	Taunan*	6 buwan
HepA	Hepatitis A	2	12 buwan
HepB	Hepatitis B	3	Pagkasilang
Hib	Meningitis	3-4**	2 buwan
IPV	Polyo	4	2 buwan
MMR	Tigdas, Beke, at Rubella	2	12 buwan
PCV	Pulmonya	4	2 buwan
RV	Rotavirus	2-3 **	2 buwan
Varicella	Bulutung-tubig	2	12 buwan

* Para sa mga bata edad 6 buwan hanggang 8 taon na unang magpapabakuna laban sa trangkaso. Inirerekomenda ang pagpapabakuna ng dalawang dosis sa agwat na hindi bababa sa apat na linggo.

** Nakadepende ang kabuuang dami ng bakuna sa edad ng bata at uri ng bakuna.